

OSCILLOCOCCINUM

Glóbulos

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos com precaução para obter os devidos resultados. Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 3 dias, consulte o seu médico. Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste informativo, informe o seu médico ou farmacêutico.

1. O QUE É OSCILLOCOCCINUM GLÓBULOS E PARA QUE É UTILIZADO ?

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no alívio de estados gripais e dos sintomas decorrentes tais como febre, dores de cabeça, arrepios, dores musculares e afins.

2. PRECAUÇÕES ANTES DE TOMAR OSCILLOCOCCINUM GLÓBULOS:

- Não tome OSCILLOCOCCINUM, glóbulos se tiver alergia às substâncias ativas ou qualquer outro componente de OSCILLOCOCCINUM glóbulos;
- Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contate-o antes de tomar este medicamento.
- Na necessidade de tomar outros medicamentos por prescrição médica, comunique a seu médico que está tomando OSCILLOCOCCINUM glóbulos.
- No caso de gravidez e aleitamento, não tome nenhum medicamento sem consultar o seu médico.
- Os glóbulos contêm sacarose e lactose.

3. COMO TOMAR OSCILLOCOCCINUM:

Adultos e crianças: A dosagem deve ser ajustada de acordo com a fase da doença:

- Prevenção: uma dose semanal durante o período de exposição à gripe.
- Estado gripal no início: uma dose de imediato. Repetir duas a três vezes com 6 horas de intervalo.
- Estado gripal declarado: uma dose de manhã e à noite durante 1-3 dias. Na persistência dos sintomas para além dos 3 dias, deverá consultar o seu médico.

Modo de usar: Coloque a totalidade do conteúdo do recipiente debaixo da língua e deixe dissolver. Se tomar mais OSCILLOCOCCINUM, glóbulos do que deveria consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de tomar OSCILLOCOCCINUM, glóbulos não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Caso tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.